

NATIVET

CONTACTO

Teléfono:(504)2516-2111

Celular:(504)99821546

Email:

ventas@nativethn.com



NATIVET

ANTIPARASITARIOS

- ALBENDEX 10%.....9
- IVONOX 1%.....10
- GOLDMEC.....11
- MITRANOX 12.5%.....12
- CUORO LIMPO.....13
- LACTUS.....14
- EQUIVERM.....15
- SUPREMO.....16
- HORSENOX.....17



NATIVET

ANTIBIOTICOS

-ANTIDIARREX.....18

-SEPTIBRON.....19

-PENIVEEX COMPLEX L.A.....20

-BATOXIL.....21





NATIVET

INTRAMAMARIOS

-TOPMAST.....22

-MASTIVEEX.....25





NATIVET

ANTIINFLAMATORIOS

-RETARDEX.....23

-NOVALGEX.....24

NATIVET

VITAMINAS
Y
MINERAL (SALES)

-NUTRIPLEX.....	26	-NUCLEO ANIONICO BCA.....	35
-NUTRIVYN CRIA.....	27	-MEJORADOR DE PEZUÑAS.....	36
-NUTRIVYN CRECIMIENTO.....	28		
-NUTRIPLEX ORO.....	29		
-BIO-EQUS.....	30		
-MULTIPLEX PREPARTO.....	31		
-NUTRIPLEX OVINOS.....	32		
-HIDRO REX VITAL.....	33, 34		

NATIVET

VITAMINAS
Y
MINERAL (INYECTADOS)

- NUTRIL VACA LECHERA.....37
- OSMOLAR VITAMINADO.....38, 39
- Revefos (REGULADOR ORGANIC).....40, 41
- R COMPLEX.....42
- NUTRIMIN.....43
- PROSEL.....44
- ACUPRIN.....45, 46


NATIVET

INICIADORES

-NUCalf UNO.....47

-NUCalf DOS.....48

-NUGallo COMBATE.....49





NATIVET

ADITIVOS

-AFLABALAN.....50

-QUITAFLAX.....51



NATIVET

HORMONALES

- PROFIT.....52
- CRONOVET.....53
- RELIN.....54
- DIOL B.....55





ALBENDEX 10%

Composición:

Albendazol (micronizado)
Excipiente c.s.p.

Indicaciones:


Control y tratamiento de
nematodos gastrointestinal,
estrongiles pulmonare,
cestodos (segmentos y
cabezas) y fasicolas (formas
adultas).

Administración y Posología:

Administrar por vía oral, en
dosis única.

Bovinos: Nematodos
gastrointestinales,
estrongilos pulmonares y
cestodos: 7,5 ml/100 kg p.v.

Fasicolas adultas: 10 ml/
100kg p.v.



Presentación:
200cm (mL)

IVONOX 1%

Composición:

Cada 100 mL contiene:
Ivermectina 1 g
Vehículo 100 mL.

Indicaciones:

Indicado para el tratamiento y control de parásitos bovinos internos y externos. Controle los siguientes parásitos bovinos: gusanos gastrointestinales (adultos y larvas de 4a etapa): (adulto). Bernes: bovis, H. lineatum. Piojos, y Ácaros.

Administración y Posología:

Administrar el producto por vía subcutánea. Observe todas las precauciones de asepsia requeridas al administrar un producto inyectable. Aplique IVONOX a una dosis de 1 ml por cada 50 kg de peso corporal. Repita la aplicación después de 90 días o según las instrucciones del veterinario.



Presentación:
50 mL, 200 mL, 500 mL

GOLDMEC

Composición:

Ivermectina 1 g
Retinol (vitamina A) 25.000.000 UI
Calciferol (Vitamina D3) 7.000.000UI
Tocoferol (vitamina E) 5.00 UI
Velculo q.s.p. 100ml

Indicaciones:

Es un antiparasitos inyectable de amplio espectro, asociado a las vitaminas A, D3 Y E. Está indicado para el tratamiento y control de infestaciones parasitarias tanto internas como externas en bovinos. Controla los nematodos gastrointestinales (incluyendo las etapas inhibidas de Ostentaría) bernés y garrapatas.

Administración y Posología:

El uso del Goldmec es de 1 ml por cada 50 kg de peso corporal que equivale a 200 mg de Ivermectina por kg de peso corporal.



Presentación:
50 mL

MITRANOX 12.5%

*Garrapatizada a base de amitraz
de mejor desempeño del
mercado.

Composición:

Cada 100 mL:
Amitraz 12,5 g
Veículo 100,00 mL

Indicaciones:

Tratamiento de infestaciones de ectoparásitos.

Bovinos: infestaciones por garrapatas *Boophilus microplus* en todas sus etapas de la vida y *Amblyomma* sp.

Ovejas y cabras: infestaciones de sarna *Psoroptica* sp, *Sarcoptica* sp, *Dermodécica* sp y piojos *Linognatus* sp y *Melophagus* sp.

Administración y Posología

Uso externo mediante pulverización. Diluir 40 ml de MITRANOX en 20 litros de agua. Cuando prepare otras cantidades, use una tabla de cuantificación. Diluir MITRANOX en el momento de la aplicación. En un recipiente, mezcle bien y vierta en un rociador manual o motorizado, homogeneice la solución y aplique. El chorro depulverización debe tener presión para que el producto penetre debajo del pelo del animal, la dirección a utilizar es contraria al pelo y al viento.

GANADO ADULTO: rocíe 5 litros de la solución.

OVEJAS Y CAPRINOS: Aplique con baño de inmersión en la proporción de 4 litros de Mitranox por cada 1000 litros de agua en la carga de 4 litros de Mitranox por cada 500 litros de agua en la recarga.



Presentación:
40 mL, 200 mL, 1 L

CUORO LIMPO

Indicaciones:

Está indicado para su uso en baños de pulverización o inmersión en ganado para combatir garrapatas (del género *Boophilus microplus* - adultos e inmaduros), vermes (larvas de *Dermatobia hominis*), mosca de cuerno (*Haematobia irritans*), mosca común (*Musca domestica*) y piojos (*Damalina bovis*, *Linognathus vituli* y *Haematopinus eurysternus*).

Composición:

Cada 100 ml contiene:
Cypermethrin 6.0 g
Clorpirifos 7.0 g
Citronelal 0,5 g
Vehículo q.s.p 100.00 mL

Administración y Posología:

Bovinos: Baño de inmersión: dilución 1 litro de cuero limpio en 2000 litros de agua. Brete de rociadores: diluya 1 litro de cuero limpio en 800 litros de agua. Solución acuosa dorsal: diluya 1 litro de cuero limpio en 400 litros de agua. Separe la lana en la espalda del animal y vierta la solución, usando 200 a 400 ml por animal. Aves: Después de eliminar por completo las aves y la basura, lave y desinfecte el cobertizo y luego rocíe la solución Cuoro Limpo en todas partes, preferiblemente con la ayuda de una bomba de alta presión. Diluya el producto en agua limpia, obedeciendo la dosis de 1 litro de cuero limpio por cada 1000 litros de agua. Rocíe toda la granja con una bomba de alta presión después de retirar por completo la cama, lavar y desinfectar el cobertizo. Se utiliza un promedio de 1000 litros de solución Cuoro Limpo para un aviario con 1.200 m² (metros cuadrados). Se recomienda un período de 48 horas para el regreso de las aves al cobertizo.



Presentación:
50 mL, 500 mL, 1 L

LACTUS

*0 dias de retiro de leche.

Composición:

Cada 100 mL contiene:
Ivermectina 1,00 g
Veículo q.s.p. 100,00 ml

Indicaciones:

Es un endectocida recomendado para el ganado vacuno, en el tratamiento y control de garrapatas, gusanos gastrointestinales redondos, verna y también como ayuda en el control de la mosca del cuerno.

Administración y Posología:

Debe administrarse mediante Pour On, con aplicación en la línea dorsal del ganado (hilo de lomo) desde la región cruzada hasta la inserción de la cola. La aplicación se realiza con la botella del producto en sí, que ya está debidamente graduada. El producto está listo para usar.



Presentación:
1 L

EQUIVERM

Composición:

Ivermectina 2,00 g
Praziculanate 10,00 g
Excipientes c.s.p. 100,00 g

Indicaciones:

Equiverm está indicado en equipos para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, pulmonares, cestodos y estados larvarios de dípteros de miasis. Contribuye al control de piojos. No administrar en equinos cuyo destino sea el consumo humano.

Administración y Posología:

La dosis sugerida es de 1 gramo de producto cada 100 kg de peso la cual queda a consideración del profesional actuante, así como el intervalo entre dosis.

Se sigue la desparasitación estratégica de los equinos estabulados cada 60-90 días. En establecimiento de cría, se recomienda la desparasitación estratégica de los equinos por lo menos dos veces al año..



Presentación:
18 g

SUPREMO 3.5%

Indicaciones:

La solución inyectable SUPREME 3.5% está indicada para el tratamiento y control de parásitos causados por nematodos gastrointestinales, garrapatas y bernards, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Nematodos gastrointestinales:

- Haemonchus placei
- Trichostrongylus axei
- Cooperia punctata
- Oesophagostomum radiatum
- Trichuris decoloración

Garrapatas:

- Boophilus microplus
- Bernes
- Dermatobia hominis

Composición:

Cada 100 mL contiene:
Ivermectina 3.50 g
Veículo 100,00 mL

Administración y Posología:

SUPREMO 3.5% debe aplicarse solo mediante inyecciones subcutáneas, debajo de la piel suelta en la región de la paleta, usando una aguja de calibre 16, con una longitud de 15 a 20 mm. Vacas: Aplique SUPREME 3.5% solo por vía subcutánea, a una dosis de 1 ml por cada 50 kg de peso corporal (700 µg de Ivermectina por kg).



Presentación:
50 mL, 500 mL, 1 L

HORSENOX

Composición:

Cada 100 g contiene:
Ivermectina 1.34 g
Excipiente 100 g

Indicaciones:

HORSENOX está indicado exclusivamente para uso oral, para el tratamiento y control de gusanos gastrointestinales (*Gasterophilus spp*), control de microfilariasis en caballos domésticos como.

Administración y Posología:

Debe administrarse por vía oral, exclusivamente para caballos. Aplicando sobre la lengua del animal, en la parte inferior de la boca. Aplicar una dosis única. El intervalo para una nueva aplicación debe seguir la guía y los criterios del veterinario. La dosis será de 1,5 g por cada 100 kg de peso o 200 mcg por kg de peso corporal.



ANTIDIAREX

Composición:

Atapulguita activada 7 g
Neomicina (sulfato) 0,5 g
Sulfadimidina (sódica) 1,2 g
Tetraciclina (clorhidrato) 0,2 g
Tylosina (tartrato) 0,2 g
Vitamina A 200.000 U.I
Vitamina C 0,5 g
Vitamina B1 150 mg
Vitamina B2 150
Vitamina B6 150 mg

Administración y Posología:

Agitar el Frasco y administrar por vía oral.
Lechones, corderos y cabritos de menos de 15 días: 1 a 2 ml/ animal/ cada 12 horas, durante 3 a 5 días.
Lechones, corderos y cabritos hasta 5 semanas 2 a 4 ml/ animal, cada 12 horas, durante 3-5 días.
Terberos: 15 a 20 ml/ terbero/ cada 12 horas, durante 3 a 5 días

Indicaciones:

Lechones, corderos, cabritos y terberos:
Tratamiento preventivo y curativo de Enteritis bacteriana de diversa etiología, Colibacilosis y Salmonelosis.



Presentación:
50 mL , 200 mL



SEPTIBRON

Composición:


Tylosina 10 g
Oxitetraciclina (clorhidrato) 4 g
Dipirona (sódica) 2,8 g
Guayacolglicerileter 3g
Prometacina (clorhidrato) 0,2 g
Excipiente c.s.p. 100 ml

Administración y Posología:

Administrar por vía intramuscular.
Cerdos, ovinos y caprinos: 1 a 2
ml/10 kg p.v/día.
Lechones: 1 ml/5 kg p.v/día
Terneros: 2 ml/10 kg p.v/día.
Bovinos adultos: 1 ml/10 kg p.v/día.
Aplicar el tratamiento durante 3 a
4 días seguidos

Indicaciones:

Porcinos: Neumonía,
Bronconeumonía, neumonía
enzootica, septicemia
hemorrágica (Pasteurellosis-
Fiebre de embarque).
Bovinos: Neumonía,
Bronconeumonía,
Neumoenteritis.
Ovinos y Caprinos: Neumonía,
Bronconeumonía.



Presentación:
100 cm (mL), 20 cm (mL)

PENIVEEX COMPLEX L.A

Composición:

Penicilina G Procaína
15.000.000 U.I
Penicilina G Benzatina
5.000.000 U.I
Dihidroestreptomicina(sulfato)
20 g
Clorfeniramina Maleato 1 g
Excipiente c.s.p. 100 ml

Administración y Posología:

Administrar por vía intramuscular.
Bovinos y Equinos adultos: 5 A 10 ml/
100 kg
Terneros y Potros: 1 ml/ 10 kg p.v.
Porcinos, Ovinos y Caprinos: 0,50 a 1 ml/
10 kg
Perros y Gatos: 0,50 a 1 ml/10 kg
En general, es suficiente la
administración de una o dos inyecciones
con un intervalo de 48- 72 horas.

Indicaciones:

Debe Bovinos: Infecciones respiratorias, infecciones genito-urinarias, Septicemias, Carbón bacteridiano, Carbón sintomático, Metritis, Actinomicosis, Afecciones podales, Heridas infectadas, Abscesos cutáneos, Listeriosis, Onfalitis.

Porcinos: Artritis, Síndrome M. M. A, Neumonía, Septicemia, Mal rojo (Erisipela), Metritis, Heridas Infectadas.

Ovinos y Caprinos: Neummonia, Pasteurelosis, Infecciones genito-urinarias, Enterotoxemia, Carbón bacteridiano, Metritis, Heridas Infectadas, Abscesos.
Equinos: Neumonía, Carbón bacteridiano, Abscesos Cutáneos.

Perros: Poliartritis, Infecciones genito-urinarias, Neumonía, Traqueobronquitis.

Gatos: Poliartritis, Infecciones genito-urinarias, Neumonía, Traqueobronquitis, Peritonitis Infecciosa.



Presentación:
100 cm (mL)

Composición:

Oxitetraciclina Base 20.00 g, vehículos y agentes de formulación csp 100.00 mL

Administración y Posología:

Bovinos, Ovinos, Porcinos y Perros

1 ml cada 10 kg de peso

Vía intramuscular profunda. No aplique más de 10 ml por punto de aplicación en bovinos y no más de 5 ml en cerdos, ovejas y perros.

Frecuencias de aplicación

Cuando la gravedad de la enfermedad lo requiera, el tratamiento debe repetirse dentro de los 3 a 5 días posteriores a la primera aplicación.

Indicaciones:

Debido a que es un antibiótico de amplio espectro, su uso se sugiere en Actinobacilosis,

Anaplasmosis, Bedomiasis, Ántrax sintomático, Coriza infecciosa, Diarrea de animales jóvenes, Enteritis bacteriana, Erisipela, Transporte fiebre, infecciones inespecíficas causadas por bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, infecciones posparto (metritis) e posquirúrgicas, Leptospirosis (*Leptospira Pomona*), mastitis septicémica, neumonía y enfermedades respiratorias, podredumbre del pie, queratoconjuntivitis, rinitis atrófica y difteria causada por *Fusobacterium necrophorum*.



Presentación:
50 mL

TOPMAST

Indicaciones:

Tratamiento de la mastitis bovina aguda y crónica causada por gérmenes sensibles a la gentamicina como: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *E. coli*, *Pseudomonas spp* y *Enterococcus spp*.

Administración y Posología:

Administrar intramamaria al ganado lactante. Después del ordeño, inculcar el producto en el canal del pezón, masajear la ubre cuidadosamente para la difusión completa del producto.

Composición:

Cada jeringa de 10 mL contiene
gentamicina (sulfato) 150 mg
Hidrocloruro de Bromexina 50 mg
vehículo g.s.p 10mL



MASTIVEEX RETARD

Composición:

Cloxacilina (benzatinica)
400 mg.
Framicetina (sulfato)
200 mg.
Excipientes de rapida
difusion 10 g.

Administración y Posología:

Tratamiento de mastitis
subclinica en periodo de
secado.

Bovinos: Aplicar un inyector
en cada cuarto.

Ovinos y Caprinos: Aplicar
mitad del inyector (5g).

Repetir el tratamiento cada
12-24 horas hasta completa
remisión de síntomas.



Presentación:
10 g

RETARDEX

Composición:

Dexametasona (fosfato sodico)
0,50 mg.
Dexametasona
(21- piridincarboxilato) 1 mg.
Excipiente 1ml.

Administración y Posología:

Administrar por vía intramuscular.
Vacas, bovinos y equinos adultos 10
ml/ animal,
Terneros, potros, ovinos y caprinos: 3
a 5 ml/ animal.
Porcinos 2 a 5 ml cerdo.
Lechones, corderos y cabritos: 1 a 2
ml/ animal.
En caso necesario repetir la
inyección en 4 días.

Indicaciones:

Porcinos: Alergias, artiritis,
inflamaciones, agalaxia, hipoglicemia
Bovinos: Acetonemia primaria de la
vaca lechera, artiritis, inflamaciones,
alergia, fiebre vitularia (Fiebre de
Leche)
Ovinos y caprinos: Artiritis,
inflamaciones, toxemia de gestación.
Equinos: Alergia, artitis, inflamaciones.



Presentación:
10 mL, 20 mL

NOVALGEX

Composición:

Dipirona (Sódica) 50 mg
Excipiente c.s.p. 100 ml

Indicaciones:

Procesos acompañados de dolores, principalmente: Cólicos, contracciones uterinas, Estados febriles e inflamatorios (artitis, tendinitis, miositis, reumatismos), Neuritis, Neuralgias, Traumatismos.
Procesos acompañados de espasmos, principalmente: Obstrucción esofágica, Meteorismo, Espasmos del cuello uterino y de la vulva en el momento del parto.

Administración y Posología:

Administrar por vía intramuscular o intravenosa lenta.
Equinos adultos: 20 a 60 ml/ animal, según peso.
Bovinos adultos: 20 a 40 ml/ animal.
Potros y Terneros: 5 a 15 ml/ animal.
Ovinos y Caprinos: 2 a 8 ml/ animal.
Porcinos: 10 a 30 ml/ animal.
Perros: 1 a 5 ml/ perro.
Estas dosis pueden repetirse varias veces al día, cada 6 a 8 horas.



Presentación:
100 mL

Indicaciones:

Suplemento de vitaminas y minerales para ser utilizado en alimentacion de ganado lechero , con un enfoque en ganado de producciones medias o bajas.

Nutriplex ha sido diseñado para mejorar la salud de las pesuñas, salud de glandulas mamarias, sistema inmunologico y mejores respuestas productivas y reproductivas.

Composición:

Humedad	Máximo	3.5	%
Calcio	Máximo	24.62	%
Calcio	Mínimo	20.52	%
Fósforo	Mínimo	12	%
Magnesio	Mínimo	5	%
Vitamina A	Mínimo	400 000	U.I.
Vitamina D 3	Mínimo	100 000	U.I.
Vitamina E	Mínimo	300	U.I.
Hierro	Mínimo	1 500	mg
Cobre	Mínimo	2 500	mg
Cobalto	Mínimo	180	mg
Zinc	Mínimo	8 500	mg
Manganeso	Mínimo	8 500	mg
Yodo	Mínimo	200	mg
Selenio	Mínimo	70	mg

Administración y Posología:

Consumo MS (kg/día)	Prod. leche (kg/día)	Grs (vacu/día)
10	> 8	70
12	10	80
14	14	90
16	16	100



Presenta
cion:
20 Kg

Indicaciones:

Suplemento nutricional para vacas de carne en sus etapas de gestacion y lactancia y su cria con minerales performance de Zinpro para una alta absorcion y fertilidad, mayor produccion de leche y calostro de mejor calidad, fortalecimiento del systema inmune de la vaca y la cria, mayor crecimiento y peso al destete.

Administración y Posología:

Se recomienda usar a libre voluntad en saladeros.
Con la finalidad de que se consuma entre 160 a 180 gramos por animal por día.

Presentacion:
Saco de 20 Kg

Composición:

Humedad	Máximo	3	%
Calcio	Máximo	12	%
Calcio	Mínimo	10	%
Fósforo	Mínimo	7	%
Magnesio	Mínimo	1	%
Vitamina A	Mínimo	200 000	UI
Vitamina D	Mínimo	10 000	UI
Vitamina E	Mínimo	400	UI
Cobre	Mínimo	750	mg
Zinc	Mínimo	3 000	mg
Manganeso	Mínimo	3 000	mg
Yodo	Mínimo	60	mg
Selenio	Mínimo	20	mg
Cobalto	Mínimo	75	mg
Sodio	Mínimo	16	%
Cloro	Mínimo	24	%
Sal (NaCl)	Mínimo	35	%
Sal (NaCl)	Máximo	42	%
Proteína Cruda	Mínimo	2.5	%
Energía Digestible	Mínimo	1 500	Kcal/Kg

Indicaciones:

**Suplemento nutricional para
bovinos de carne en crecimiento
desde el destete hasta salida al
mercado, con minerales
Performance Minerales de Zinpro
para una alta absorcion, para una
mayor ganancias diaria de peso, un
conversion alimeticia mejorada,
mejora el sistema inmunologica y
mejora la calidad de canal.**

Administración y Posología:

Se recomienda usar a libre
voluntad en saladeros.
Con la finalidad de que se
consume entre 120 a 180
gramos por animal por día.

Composición:

Humedad	Máximo	3	%
Calcio	Máximo	10,8	%
Calcio	Mínimo	9,5	%
Fósforo	Mínimo	5	%
Magnesio	Mínimo	1	%
Vitamina A	Mínimo	200 000	UI
Vitamina D3	Mínimo	10 000	UI
Vitamina E	Mínimo	80	UI
Cobre	Mínimo	750	mg
Zinc	Mínimo	3 000	mg
Manganeso	Mínimo	2 500	mg
Yodo	Mínimo	60	mg
Selenio	Mínimo	10	mg
Cobalto	Mínimo	90	mg
Cromo	Mínimo	40	mg
Sodio	Mínimo	24	%
Cloro	Mínimo	36	%
Proteína Cruda	Mínimo	1,5	%
Energía Digestible	Mínimo	1 500	Kcal/Kg
Sal (NaCl)	Mínimo	55	%
Sal (NaCl)	Máximo	66	%



Presentacion:
Saco de 20 Kg

Composición:

Humedad	Máximo	3.5	%
Calcio	Máximo	21	%
Calcio	Mínimo	18	%
Fósforo	Mínimo	14	%
Magnesio	Mínimo	7	%
Vitamina A	Mínimo	500 000	U.I.
Vitamina D 3	Mínimo	100 000	U.I.
Vitamina E	Mínimo	1 000	U.I.
Cobalto	Mínimo	4 000	mg
Hierro	Mínimo	1 000	mg
Cobalto	Mínimo	120	mg
Zinc	Mínimo	14 000	mg
Manganeso	Mínimo	6 500	mg
Yodo	Mínimo	300	mg
Selenio	Mínimo	75	mg

Indicaciones:

Suplemento mineral vitaminado enfocado a lechería especializada. Por su diseño esta orientado a mejorar la salud de las pezuñas, glandula mamaria y sistema inmunologico, es un coadyuvante en la reduccion de conteo de celulas somaticas y mejoaras en las respuestas reproductivas

Administración y Posología:

	Producción de leche (kg/día)	Dosis (Gramos/animal/día)
Vaca lactante	30	100-120
Vaca lactante	20-30	60-90
Vaca lactante	Menores a 20	50-60
Desarrollo de terneros		30-50
Novillas Preñadas		40-50
Vaca Seca	Mezcla 1 bota de Nutriplex con 40 kg de sal común y ofrecer a libre voluntad	



Presentacion:
Saco de 20 Kg

BIO-EQUUS

Composición:

Humedad máxima 3.00%
 Vitamina A mínimo 1.500.000 U.I.
 Vitamina D3 mínimo 750.000 U.I.
 Vitamina E mínimo 5.000 U.I.
 Vitamina B1 mínimo 2.500 mg
 Vitamina B2 mínimo 1.500 mg
 Biotina mínimo 700 mg
 Hierro mínimo 5.000 mg
 Cobre mínimo 2.000 mg
 Cobalto mínimo 310 mg
 Zinc mínimo 5.900 mg
 Manganeseo mínimo 4.700 mg
 Yodo mínimo 100 mg
 Selenio mínimo 35 mg
 Metionina mínimo 2% Vehículo
 csp 1.000.000 mg

Indicaciones:

Este núcleo esta recomendado
 para ser utilizado como
 suplemento de vitaminas y
 minerales orgánicos,
 coadyuvante el mantener la
 salud de cascos y pelaje equinos.
 La dosis a utilizar es de 30
 gramos para caballos adultos y
 15 g para caballos de
 crecimiento.



Presentación:
 15 Kg

MULTIPLEX PREPARTO

Administración y Posología:

Utilizar de 60- 80
gramos de Multiplex
transicion en vacas y
novillas preparto de 22
dias a 1 mes (antes de
parto)

Composición:

Humedad	Máximo	3	%
Biotina	Mínimo	50	mg/kg
Niacina	Mínimo	6 000	mg/kg
Pantatenato de calcio	Máximo	3 000	mg/kg
Cobalto	Mínimo	22	mg/kg
Acido Fólico	Mínimo	200	mg/kg
Hierro	Mínimo	20 000	mg/kg
Cobre	Máximo	2 000	mg/kg
Zinc	Mínimo	10 000	mg/kg
Manganeso	Mínimo	8 000	mg/kg
Yodo	Mínimo	100	mg/kg
Selenio	Mínimo	60	mg/kg
Vitamina A	Mínimo	800 000	U.I/kg
Vitamina D 3	Mínimo	120 000	U.I/kg
Vitamina E	Mínimo	5 000	U.I/kg
Vitamina B2	Mínimo	3 000	mg/kg

Indicaciones:

Suplemento mineral vitaminado
para vacas en transicion. Esta
formula ha sido diseñada para
proporcionar una buena
nutricion mineral a la vaca pero
sobre todo generar una buena
nutricion mineral generacional
osea de la vaca al ternero



Presentacion:
Saco de 20 Kg

NUTRIPLEX OVINOS

Administración y Posología:

Debe ser utilizada en cordero en una cantidad variable según el peso corporal del animal para proveer 0.5 mg de decoquinato por kilogramo de peso vivo por animal por día

Indicaciones:

Suplemento para ovinos diseñado para la prevención de la coccidiosis en ovejas jóvenes causada por *Eimeria bakuensis*, *Eimeria crandallis*, *Eimeria avinoidalis* y *Eimeria parva*.
Minerales de alta absorción.

Composición:

Calcio	Máximo	18.13	%
Calcio	Mínimo	15.11	%
Sal	Máximo	14.70	%
Sal	Mínimo	12.25	%
Fósforo	Mínimo	3	%
Magnesio	Mínimo	0.75	%
Vitamina A	Mínimo	50 000	U.I.
Vitamina D-3	Mínimo	12 500	U.I.
Vitamina E	Mínimo	38	U.I.
Hierro	Mínimo	500	mg
Biotina	Mínimo	110	mg
Cobre	Mínimo	140	mg
Zinc	Mínimo	790	mg
Manganeso	Mínimo	830	mg
Yodo	Mínimo	13	mg
Selenio	Mínimo	10	mg
Cobalto	Mínimo	12.3	mg



Presentación:
Saco de 20 Kg



HIDRO REX VITAL

Composición:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| Treonina 0.64 g | Vitamina A 2,000,000 I.U |
| Serina 0.66 g | Vitamina D3 500,000 I.U |
| Ácido glutámico 2,64 g | Vitamina E 0.9 g |
| Prolina 1.15 g | Vitamina B1 0.5 g |
| Glicina 1,53 g | Vitamina B2 1 g |
| Alanina 1.74 g | Vitamina B6 0.3 g |
| Cistina 0.126 g | Vitamina B12 3 mg |
| Metionina 1.11 g | Vitamina C 5 g |
| Isoleucina 0,98 g | Vitamina K3 0.5 g |
| Leucina 2.01 g | Ácido fólico 0.1 g |
| Fenilalanina 0,77 g | Ácido nicotínico 2 g |
| Tirosina 0.68 g | Pantotenato de calcio 1 g |
| Lisina 2.07 g | Ácido aspártico 1,45 g |
| Histidina 0.56 g | |
| Arginina 1.41 g | |
| Triptófano 0.367 g | |
| Excipiente hasta 100 ml. | |

Indicaciones:

Aves de corral, ganado, caballos, cerdos, ovejas, cabras y conejos: en períodos de desequilibrio y deficiencia alimentaria. Durante la convalecencia después de infecciones virales y bacterianas o infestaciones parasitarias como restaurador orgánico. En período de estrés (vacunas, transporte, cambios de vivienda, etc.). Durante la muda en aves de corral. Promotor de crecimiento y para activar la producción animal. En períodos de lactancia y embarazo. Enfermedades hepáticas (hígado graso) o protector hepático.

HIDRO REX VITAL

Administración y posología:

Vía oral, en agua potable. Aves de corral: en general: 1 ml / lt de agua potable / día, durante 5 días. Promotor de crecimiento: 0,5 ml / lt de agua potable / día, durante los primeros 5 días después del nacimiento o después de la vacunación contra Gumboro o más de 30 días, durante 5 días. Cerdos: cerdos lactantes: 2 ml / lt de agua potable / día. Cerdos de engorde: 1 ml / lt de agua potable / día. Cerdas lactantes: 2 ml / lt de agua potable / día. Administrador durante 5 días. Ganado, caballos, ovejas y cabras: animales jóvenes: 1 ml / lt de agua potable / día. Animales adultos: 0,5 ml / lt de agua potable / día. Administrador durante 5 días. Conejos: 2 ml / lt de agua potable / día, para 7 días.



Presentación:
1 L

Composición:

Humedad	Máximo	5	%
Cloruro	Mínimo	23.66	%
Magnesio	Mínimo	5.9	%
Fosforo	Mínimo	2.75	%
Vitamina A	Mínimo	1 000 000	UI
Vitamina D	Mínimo	225 000	UI
Vitamina E	Mínimo	12 500	UI
Cobre	Mínimo	800	mg
Cobalto	Mínimo	50	mg
Iodo	Mínimo	70	mg
Selenio	Mínimo	24	mg
Cromo	Mínimo	30	mg
Manganeso	Mínimo	3 300	mg
Zinc	Máximo	3 500	mg

Indicaciones:

Es un producto con tecnología de punta, orientado a la prevención de los problemas Metabólicos relacionados al parto comunmente llamado periodo de vaca en transición. Disminuyen problemas como mastitis, metritis, cetosis, hipocalcemia. Logra mayor producción de leche por lactancia.

Administración y posología:

Se recomienda dar una dosis de 150 a 250 gramos por animal por día en vacas de 22 días a 1 mes pre parto, la dosis dependerá anioncation de la ración.

Presentación:
Saco de 20 Kg

MEJORADOR DE PEZUÑAS

Indicaciones:

Premezcla Nutricional especialmente formulado para bovinos de leche y carne que contiene complejos metal-aminoácidos de Zinpro. Este mineral hace que los cascos de los animales sea mas resistente.

Administración y posología:

Esta premezcla es recomendado para ser utilizada como suplemento organico y coadyuvante. En novillo la dosis es de 10 a 16 g. Adultos utilizar de 30 a 40 gramo por animal adulto. En alimentos balanceados dosificar una dosis de 4 kg por tonelada metrica.

Composición:

Biotina	Mínimo	400	mg
Zinc	Mínimo	9 500	mg
Cobre	Mínimo	2 300	mg
Manganeso	Mínimo	2 700	mg
Cobalto	Mínimo	535	mg



Presentacion:
Saco de 20 Kg

NUTRIL VACA LECHERA

Administración y posología:

Administrar por vía intramuscular
Vacas Lecheras: 1 ml por 30 kg p.v,
vada 90 días.

Indicaciones:

Vacas Lecheras: Zonas con pastos deficientes en macro-elementos minerales (Calcio, Fosforo, Magnesio) y oligo-elementos minerales (cobre, cobalto, yodo, selenio). Tratamiento preventivo de la paresia puerpal en vacas preñadas y vacas en lactación. Tratamiento preventivo de la retención placentaria. Para acortar el periodo de anestro

Composición:

Calcio Hiposfito 2 g
Cobre Cloruro 100 mg
Cobalto Cloruro 100 mg
Magnesio Cloruro 100 mg
Yodo Coloidal 300 mg
Selenio 67,5 mg
Vitamina B12 500 mcg
Vitamina D2 100.000 U.I
Vitamina A 500.000 U.I
Excipiente 100 ml



Presentación:
250 mL

Composición:

Glucosa 5 g	
Calcio Cloruro 15 mg	
Potasio Cloruro 25 mg	
Magnesio Hipofosfito 20 mg	
Sodio Acetato 250 mg	
L-Histidina Clorhidrato 2 mg	L- Leucina 4 mg
DL- Metionina 2 mg	Monosodio Glutamato 5 mg
L- Triptofano 1 mg	Tiamina Clorhidrato 10 mg
L- Cistina Clorhidrato 1 mg	Riboflavina 4 mg
L- Treonina 3,5 mg	Piridoxina Clorhidrato 10 mg
L- Isoleucina 4,5 mg	Nicotinamida 150 mg
L- Arginina Clorhidrato 2,5 mg	D- Pantenol 5 mg
L- Fenilalanina 4 mg	Excipiente Acuoso Esteril 100 ML
L- Valina 5 mg	
L- Lisina Clorhidrato 5 mg	

Administración y posología:

Administrar por vía intravenosa muy lenta, intramuscular o subcutánea.

Terneros y Potros: 10 ml/ kg p.v/ día.

Bovinos y Equinos adultos: 500- 2.000 ml/ animal/ día, según el peso.

Estas dosis pueden variar según criterio del médico veterinario.

La duración del tratamiento tiene que adaptarse a cada caso en particular y teniendo en cuenta los problemas observados.

Indicaciones:

Bovinos y Equinos:
y tratamiento de la deshidratación,
desequilibrio electrolítico e
hipoproteïnemia.

En casos de diarreas de origen
bacteriano, viral o nutricional;

Hipertermia; Estados de Shock; Vómitos;

Infestaciones Parasitarias; Debilidad;

Agotamiento Físico; Convalecencia.

Acetomenia (Cetosis) de la vaca lechera.

Como complemento de la
desparasitación interna, vacunaciones y
tratamientos anti infecciosos.



Presentación:
500 cm (mL)

REVEFOS (REGULADOR ORGANICO)

Composición:

Vitamina D2 2.000.000 U. I
Vitamina E 100 mg
Vitamina B12 5 mg
L- Triptofano 50 mg
L- Leucina 210 mg
L- Lisina Clorhidrato 1.000 mg
L- Valina 200 mg
L- Glicina 420 mg
L- Arginina Clorhidrato 200 mg
DL- Metionina 210 mg
L- Histidina Clorhidrato 210 mg
Cobre Sulfato 2 mg
Cobalto Sulfato 13 mg
Magnesio Hiposfosfito 210 mg
Calcio Gluconato 1.500 mg
Zinc Gluconato 10 mg
Monosodio Glutamato 420 mg
Sodio Cloruro 42 mg
Potasio Cloruro 15 mg
Excipiente c.s.p. 100 ml

Administración y posología:

- Administrar por vía subcutánea o intramuscular.

• **Bovinos y Equinos Adultos: 10 ml/animal.**

• **Terneros y Potros: 5 ml/ animal.**

: Ovinos y Caprinos: 5 ml/ animal.

• Corderos y Cabritos: 2 a 3 ml/
animal.

Indicaciones:

Bovinos, Equinos Ovinos y Caprinos:
Estados carenciales en general.
Reconstituyente, factor de crecimiento y engorde. Aumento de la producción láctea en vacas lecheras. Reconstituyente en hembras antes y después del parto. En machos y hembras antes del servicio.
Recuperación de sementales durante el descanso. Como complemento de la desparasitación interna, vacunaciones y tratamientos antiinfecciosos. Preparación de animales para exposición.



Presentación:
250 mL

R-COMPLEX

Composición:


Vitamina B1 clorhidrato 10 g.
Vitamina B2 fosfato sódico 0,5 g.
Vitamina B6 clorhidrato 5 g.
Vitamina B12 10 mg.
Nicotinamida 15 g.
D-Panetol 0.5 g.
Excipiente c, s,p, 100 ml.

Indicaciones:

Bovinos, Porcinos, Equinos, ovinos, caprinos y perros: Avitaminosis del grupo B, convalecencia, estrés, anemia, anorexia, intoxicación, trastornos nerviosos, atonías intestinales, trastornos metabólicos, alteraciones hepáticas, después de tratamientos prolongados con antibióticos o quimioterápicos. Favorecedor del crecimiento y la lactación. Para mejorar producción.

Administración y posología:

Administrar por vía intramuscular o intravenosa lenta
Bovinos y equinos: 1 ml/100 kg p.v/ día.
Porcinos, ovinos y Caprinos: 0,5 ml/ kg p.v/ día.
Perros: 0,5 a 2 ml/ perro/ día.
Administrar durante 2 a 3 días, si es necesario.



Presentation: 250 cm (mL)

NUTRIMIN

Indicaciones:

Nutrimin es un suplemento nutricional inyectable, compuesto de un núcleo vitamínico-mineral especialmente indicado para optimizar y equilibrar el metabolismo general del animal, en estados de deficiencia o desnutrición en relación con deficiencias solas o combinadas de calcio, selenio, fósforo, cobre, zinc, Potasio, vitamina E, A y metionina, elementos esenciales en la activación metabólica enzimática.

El tratamiento de las deficiencias mencionadas mejora la apariencia general del animal, el desarrollo de la masa muscular y ósea, el aumento de parámetros productivos como el crecimiento, el aumento de peso diario y la producción de leche, y la condición del cabello.

Administración y posología:

Administrar subcutánea.
Corderos: 1 ml / 15 kg Vacas: 1 ml / 40 kg
Ovejas: 1 ml / 25 kg Toros: 1 ml / 50 kg
Swine: 1 ml / 40 kg novillos, novillas y terneros: 1 ml / 50 kg
Se sugiere repetir el tratamiento cada 60 días.

Composición:

Edito de cobre y zinc 22.500 g;
D-L metionina 1.500 g; ácido de fosfato de potasio 0.200 g;
Acetato de vitamina E 0.750 g;
Palmitato de vitamina A 0.150 g;
Cloruro de calcio 0.014 g;
Selenito de sodio 0,006 g;
Excipientes q.s.f.100.00 ml.

FRENTE A4

NutriminTM

Convierte Carencias en Ganancias

NutriminTM El Suplemento Vitamínico Mineral desarrollado por Richmond Vet Pharma, que convierte las carencias de su hacienda en ganancias para Ud.

De uso simple, práctico, económico y con una óptima combinación equilibrada de nutrientes esenciales (*). Nutrimin es mucho más que un simple calcio.

Una herramienta vital indicada en Bovinos productores de leche y carne, ovinos, caprinos y porcinos.

(*) Nutrimin
Calcio
Cobre
Zinc
Selenio
Vitaminas A & E
Metionina
Fósforo
Potasio



Sus Animales Sanos y Fuertes Siempre

Presentación: 530 cm 250
cm 100 cm (mL)

PROSEL

Administración y posología:

1 a 2 ml / 50 kg de peso.
Con un intervalo mínimo entre dosis
de 30 días.
Solo inyectable por vía subcutánea.

Composición:

Selenito de sodio (anhidro)
0,035 g; Acetato de vitamina
E (DI alfa tocoferol) 0,750 g;
Palmitate de vitamina A
255.000 UI; Fosfato de
diácido de potasio 1.500 g;
Agentes de formulación y
agua estéril para inyección
qsf 100 ml.

Indicaciones:

Se indica como curativo y preventivo de
estados de deficiencia de origen primario
o secundario, con respecto a selenio,
vitaminas E y A en bovinos y ovinos.
Prosel previene y revierte enfermedades
fisiopatológicas y desequilibrios
metabólicos como el anestro nutricional
y el síndrome de deficiencia de
infertilidad, previene la osteomalacia y el
raquitismo.

Prosel está indicado como curativo y
preventivo en la distrofia muscular
nutricional (enfermedad de los músculos
blancos, ETS / síndrome de deficiencia de
selenio-tocoferol) en corderos y terneros.
Uso en bovinos y ovinos de cualquier
raza, edad y sexo.



Presentación:
100 cm (mL)



ACUPRIN

Composición:

Edetato de cobre y zinc
40,3 g; DI metionina 1,1 g;
Agentes y agua purificada
estéril q.s.f. 100,00 ml.

Administración y posología:

Animales de menos de 200 kg: 2 ml
en total

Animales de más de 200 kg: 3 ml en
total

novillo, vaquillas, toros y vacas:
máximo 4 ml en total

Ruta de aplicación: exclusivamente
por vía subcutánea.

Esta dosis debe respetarse tanto
para tratamientos curativos como
preventivos, independientemente
de la especie, edad, sexo, raza y
categoría del animal o sistema
productivo.

Indicaciones:

La acuprina está indicada como curativa y preventiva del origen primario o secundario de estados carenciales, con respecto al cobre y / o zinc, en bovinos, ovinos y porcinos.

La acuprina previene y revierte enfermedades fisiopatológicas y desequilibrios metabólicos como:

Anestro Nutricional

Síndrome de infertilidad por deficiencia

Abortos

Retenciones placentarias debido a la mala nutrición.

Absorción Embrionaria

Mastitis subclínica

Ovarios quísticos y poliquísticos

Calor repetido

Muerte perinatal

Metritis



Presentación:
100 cm (mL)

NUCALF UNO

Composición:

Humedad 12%
Proteína Cruda 22%
Grasa Cruda 3%
Fibra cruda 5%
Cenizas 7%
E.L.N. 51%

Beneficios:

Menos desperdicios gracias a su excelente pelet.
Mejor palatabilidad y digestibilidad del almidón.
Alta disponibilidad y eficiencia en su uso.
Conversión Alimenticia esperada de 1.2.

Indicaciones:

Suministrar NUCALF uno a libre acceso desde la primera semana de vida y durante la lactancia.
Ofrecer agua limpia y fresca a libre acceso.
Suministrar heno de buena calidad a partir de los 45 días de edad o acceso a potreros pequeños con pasto tierno.



Presentación:
30 kg

NUCALF DOS

Composición:

Humedad 12%
Proteína 17%
Grasa Cruda 3%
Fibra Cruda 2.5%
Cenizas 7%
E.L.N. 58.5%

Beneficios:

Facilidad de transición en el momento del destete.
Mejor salud al momento del destete.

Indicaciones:

Dar un periodo de transición de 5 días después del destete realizando mezclas crecientes incorporando el NUCALF uno al NUCALF dos.
Ofrecer a libre acceso hasta un consumo máximo de 3 kg por día o 2% del peso vivo.
Continuar ofreciendo heno de buena calidad o acceso a potreros

Presentación:
Saco de 30 Kg

NUGALLO COMBATE

Composición:

Es una mezcla con el 17% de proteína cruda de 10 semillas, dos pellet y una croqueta extruida con los niveles de vitaminas y minerales que hacen de su gallo un excelente peleador.

Indicaciones:

Alimentos especial para preparar a los gallos para la pelea, el cual permite obtener su máximo rendimiento al mejorar la masa muscular y la resistencia al promover las funciones corporales que se activan en los momentos de estrés físico (rendimiento atlético); acelera la recuperación después de la pelea al auxiliar la cicatrización y mejorar el funcionamiento del sistema inmune, permite además un excelente desarrollo de la pluma en la época de pelecha.



Presentación:
25 kg

AFLABALAN

Composición:

Sílice máximo: 65.60%
Oxido de Sodio mínimo: 0.20%
Oxido de Calcio máximo: 3.90%
Oxido de Aluminio
mínimo: 6.65%
Excipiente C.BP.: 100%

Administración y posología:

Suministrar de 2 a 5 kilos
por tonelada de un
alimento terminado.

Indicaciones:

Secuestrante de Micotoxinas
para la formulación de
alimentos para el uso de aves,
cerdos, bovinos y ovinos.



Presentación:
25 kg



QUITAFLAX

Composición:

Sílice (SiO₂) máximo 66.00%
Oxido de Sodio mínimo 0.24%
Oxido de calcio máximo 4.20%
Oxido de Aluminio mínimo 6.90%
Excipiente 100%

Administración y posología:

Suministrar de 3 a 5 kilos por
tonelada de alimento
terminado. Vía de
administración oral.

Indicaciones:

Secuestrante de micotoxinas
para la formulación de
alimento terminado para aves,
cerdos, bovinos y ovinos.



Presentación:
25 kg

Indicaciones:

Es un promotor de crecimiento, desarrollo y engorde especialmente formulado para su uso en animales destinados a la producción de carne exclusivamente.

Administración y posología:

1 mL cada 50 kg de peso vivo.
Dosis máxima sugerida: 10 mL totales.
Inyectable subcutáneamente.

Composición:

Testosterona,
propionato 5,20 G
Vitamina A
Palmitato 1,00 g
Vitamina E
Acetato 1,00 g
Excipientes csp. 100,00 mL



Presentación:
100 cm 250 cm (mL)

CRONOVET 2

Composición:

D-Cloprostenol 75 µg/mL.

Indicaciones:

Cronovet 2 produce la regresión morfológica y funcional del cuerpo lúteo (luteólisis), seguido de un retorno al calor dentro de 2 a 4 días después del tratamiento con una ovulación normal; considerando que hay un período refractario que incluye desde la ovulación hasta 5 a 7 días después, donde no aparecen los efectos luteolíticos de las prostglandinas.

Administración y posología:

Bovinos: 150 µg (2,0 mL del producto) por animal.

Porcinos: 75 µg (1,0 mL del producto) por animal.

En ambas especies administrar vía IM, en las tablas del cuello o en los cuartos posteriores.

Ovinos: 38 µg (0,5 mL del producto) por animal. IM en cuartos posteriores



Presentación:
20 mL

RELINE

Composición:

Acetato de Buserelina 4
µg/mL.

Administración y posología:

Injectable. Vía IM. Uso
terapéutico.

Bovinos: 16 µg totales,
Caballos: 40 µg totales,
Conejas: 0.8 µg totales.

Indicaciones:

La buserelina es un análogo
sintético (agonista) de la hormona
liberadora de gonadotropina
hipotalámica. La Buserelina se
indica para el tratamiento de
quistes ováricos y sincronización
de la ovulación.



Presentación:
20 mL

DIOL B

Composición:

Benzoato de estradiol 1 mg/mL

Indicaciones:

Tratamiento de celo silencioso y anestro post parto en bovinos. Complemento en la sincronización e inducción de celo, con progestagenos: IATF

Administración y posología:

Injectable vía IM.
Sincronización y anestro:
3mg, Celo: 2 mg..



Presentación:
50 mL



CONTACTOS DE NUESTROS VENDEDORES

Vendedor: Carlos López Tel: 9905-2458 Zonas que atiende: Centro Danlí Olancho Sur.	Gerente de Ventas: Dr. William Hernandez Tel: 9982-1546	Vendedor: Jose Alberto Figueroa Tel:9905-2458 Zonas que atiende: NorOccidente Litoral
--	---	---

Redes Sociales:
Instagram: Nativethn
Facebook: Nativet

Oficina:
Tel:9635-4643
ventas@nativethn.com

